Samtykkeerklæring og information om behandling med Botulinum Toxin

Hvad er Botulinum Toxin?

Botulinum Toxin er et naturligt forekommende proteinmolekyle, der dannes ved oprensning af bakterien Clostridium Botulinum. Når Botulinum Toxin injiceres, hæmmes de nerveimpulser, der får musklerne til at trække sig sammen.

Forventet resultat af behandlingen

Botulinum Toxin bruges kosmetisk til at afslappe udvalgte ansigtsmuskler, hvilket især udglatter både dynamiske og statiske rynker.

Virkningen af behandlingen begynder at indtræde efter 48-72 timer (hos nogle 4 til 7 dage). Den maksimale effekt opnås først efter 2 uger. I sjældne tilfælde er der behov for en touch-up. Effekten af behandlingen kan variere individuelt, men varer ca. 3-6 måneder. Når behandlingen er blevet gentaget flere gange, opnår de fleste en længerevarende effekt. Selve toxinet er aktivt i 2,5 måneder.

Sportsudøvere bruger deres mimik mere under sport og kan derfor forvente en kortere varighed af behandlingen.

HUSK Linjerne skal have tid til at rejse sig, da huden har været foldet flere gange ved bevægelse. Effekten af behandlingen afhænger af bevægeligheden og ikke af linjen i sig selv.
OBS Ved brynløft ses kun et løft på 1-3 mm, hvilket svarer til, hvor meget musklen kan afslappes og dermed falde på plads.

Kontraindikation/forsigtighedsregler

Behandlingen bør ikke udføres, hvis du

- Er gravid eller ammer
- Har aktive infektioner (f.eks. herpes, acne, cellulitis)
- Har hypertrofi, keloid eller dårlig sårheling
- Har blødningsforstyrrelser eller tager antikoagulanter
- Har immunsuppression eller hudatrofi (f.eks. steroidbrug, Ehler-Danlos syndrom)
- Lider af aktiv hudsygdom i behandlingsområdet
- Er overfølsom over for Botulinum Toxin A, albumin, laktose eller sodium
- Har neuromuskulære sygdomme (f.eks. Lambert-Eaton syndrom, myopati, polio, Bells parese)
- Har haft øjenkirurgi (inkl. laser) inden for de seneste 6 måneder
- Bruger medicin indeholdende aminoglycosider, penicilliner, quinin eller calciumkanalblokkere
- Arbejder i et erhverv, der kræver øget ansigtsmimik
- Lider af bodydysmorfi eller har urealistiske forventninger

Komplikationer

Botulinum Toxin-indsprøjtninger er generelt en sikker og effektiv behandlingsmetode, men bivirkninger kan forekomme. De fleste forsvinder hurtigt.

Almindelige

- Let smerte
- Hævelse, blå mærker ved indstiksstedet
- Ødemer
- Hovedpine
- Infektion
- Føleforstyrrelser (dystoni)
- Angst
- Vasovagale tilfælde og besvimelser

Mindre almindelige

- Lokal stikkende/brændende fornemmelse
- Hængende øjenlåg (blepharoptosis)
- Hængende øjenbryn (ptosis)
- Ectropion (eversion af nedre øjenlåg)
- Lagophthalmos (øjenlåget kan ikke lukkes helt)
- Epiphora (tåreflåd)
- Dobbeltsyn (diplopia)
- Svækket blinkerefleks eller tics
- Lysfølsomhed (photophobia)
- Infraorbital festoning (forværrede poser under øjnene)
- Læbeptosis, asymmetrisk smil eller tale- og spisebesvær (oral incompetence)

Sjældne

- Hals- eller nakkesvaghed og asymmetri
- Lokal hududslæt

Andre komplikationer

- Globetrauma
- Cheek flaccidity (atrofi af kinder)
- Hoarseness
- Svækkelse af nakkemuskulatur (asymmteri)
- Udvikling af antistoffer (resistensudvikling)

Meget sjældne

- Urticaria
- Erythema/rødme
- Anafylaksi
- Synke- og talebesvær (meget sjældent ved korrekt anvendelse)

Andre komplikationer kan opstå ved doser over 300 IE.

Precare
- Undgå alkohol og andre blodfortyndende midler som fiskeolie, ibuprofen, ipreen og andre NSAID'er samt A- og E-vitaminer (f.eks. betacarotin), ginseng, ingefær og hvidløgspiller.

Forsøg at undgå disse midler gerne 2 dage før behandlingen (fiskeolie gerne 14 dage før).

Aftercare
- Undgå berøring og makeup i 12 timer.
- Undgå karbad, dampbad, sauna osv. i 12 timer.
- Undgå sol de første 5 dage.
- Undgå at ligge fladt de første 4 timer.
- Undgå motion det første døgn.

Teknik og dosis fremgår af instruksen for klinikken og er overholdt ift. Allerganregime (se instruks for botulinum toxin afsnit 7).

Teknik generelt
- Intradermal
- Subdermal
- Intramuskulær

Disse vil variere pr. område.
Hvis der, imod forventning, skulle opstå nogen af de ovennævnte komplikationer eller bivirkninger, er det vigtigt, at du kontakter vores klinik med det samme på vores akutte telefon, da vi har den fornødne ekspertise og fagligt dygtigt sundhedspersonale til at håndtere disse situationer.

AKUT telefon 51 33 50 00

Effekt af behandlingen

Oftest giver behandlingen en god og tydelig reduktion af de dynamiske rynker. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have større mængder toxin end andre for at opnå effekt. Der kan være nogle få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toxinets effekt.

Information og samtykke til behandling

Efter at have gennemlæst denne skriftlige information skal du have mundtlig information om behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Du har også mulighed for at medbringe en bisidder. Efter den mundtlige information skal der være mindst 48 timers betænkningstid, før du giver dit samtykke til behandlingen.

Med din underskrift giver du dit samtykke til behandling med Botulinum Toxin og til, at AbyA behandler dine personoplysninger. AbyA opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, samt i henhold til krav om patientjournaler. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Jeg er blevet informeret om virkninger, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse med behandling med Botulinum Toxin.

Min behandler har givet mig mulighed for at stille spørgsmål, og jeg har haft mulighed for at medbringe en bisidder ved konsultationen. Jeg har fået tilfredsstillende svar på mine spørgsmål. Jeg har haft 48 timers betænkningstid inden min behandling.

Jeg har svaret ærligt på spørgsmålene om min medicinske historie.

Jeg giver hermed min tilladelse til at blive behandlet.

Dato _____

Navn (blokbogstaver) Underskrift

evt. note